Les informations jointes sont un extrait de l'étude de Madame Barboiron, qui peuvent être lues sous l'adresse indiquée ci-dessous.

HAL open science

Les ongulés sauvages en France. Synthèse des données du Réseau Ongulés Sauvages OFB-FNC-FDC

Aurélie Barboiron

▶ **To cite this version:**

Aurélie Barboiron. Les ongulés sauvages en France. Synthèse des données du Réseau Ongulés Sauvages OFB-FNC-FDC. Réseau Ongulés sauvages OFB-FNC-FDC; OFB, Office Français de la Biodiversité; FNC, Fédération Nationale des Chasseurs. 2026, 352p. ⟨hal-05269556v2⟩

HAL Id: hal-05269556
https://ofb.hal.science/hal-05269556v2

Submitted on 1 Sep 2026

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons CC BY 4.0 - Attribution - International License

V. Le Sanglier (*Sus scrofa*)

V.1. Fiche d'identité



Figure V.1. *Groupe de jeunes marcassins. L. Sabathé*

Nom

- Latin : *Sus scrofa* (Linnaeus, 1758)
- Anglais : Wild boar
- Selon l'âge :
  - 0 - 5 mois : marcassin
  - 5 mois -1 an : bête noire
  - 1 an ou plus : Laie pour les femelles et sanglier ou cochon pour les mâles

Classification

- Mammifères/ Cétartiodactyles/ Suidés

Statut réglementaire

- Espèce chassable (Arrêté du 26 juin 1987)

Poids

- À la naissance : aux alentours de 1 kg
- Mâle : 44-300 kg
- Femelle : 70-80 kg

Pelage

- Jeune rayé de brun et de beige jusqu'à 4 mois (marcassin) puis de couleur rousse jusqu'à 8 à 9 mois
- Pelage marron à noir (tendance parfois pour de vieux individus à devenir gris)
- Longs poils de jarre sombres (soies) et bourre épaisse en hiver; après la mue printanière, soies très courtes d'aspect argenté
- Tête longue terminée par un groin
- Canines inférieures du mâle adulte à croissance continue (défenses)

Distinction mâle/femelle

- Pas de distinction évidente sans la présence de mamelles ou de pinceau pénien apparent

Habitat

- Espèce généraliste, présent dans une grande variété de milieux, souvent pourvus d'une végétation arbustive dense : forêts (surtout), maquis, garrigues, landes, friches, etc.; présent aussi dans les zones agricoles et urbaines

Régime alimentaire

- Espèce omnivore, opportuniste, s'alimentant surtout de végétaux (fruits forestiers, céréales, racines, bulbes, plantes, etc.) et complémentairement d'animaux (arthropodes, lombrics, couvées d'oiseaux, charognes, etc.).

Reproduction

- Maturité sexuelle : dès 10 mois pour les mâles / entre 8 et 24 mois (à environ 35 kg) pour les femelles
- Rut : rut surtout en hiver (variable en fonction des fructifications forestières)
- Gestation : 115 jours
- Naissance : en moyenne 5 à 7 jeunes par portée (surtout en mars-avril)

Longévité


- de 10 à 12 ans

Comportement social

- Espèce sédentaire et sociale, vivant en groupes familiaux (compagnies) centrés autour d'une ou plusieurs femelles et de leurs jeunes
- Mâles solitaires, se rapprochant des compagnies au moment du rut
- Activité essentiellement nocturne (déplacements surtout à l'aube et au crépuscule)

Domaine vital

- De l'ordre de 1000 ha pour les femelles et 2000 à 3000 ha pour les mâles


Evolution des tableaux de chasse de sangliers
dans les régions de France
AUVERGNE-RHONE-ALPES
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
BRETAGNE
CENTRE-VAL DE LOIRE
CORSE
GRAND EST
HAUTS DE FRANCE
ILE-DE-FRANCE
NORMANDIE
NOUVELLE-AQUITAINE
OCCITANIE
PAYS DE LA LOIRE
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Prélèvements
150000
100000
50000
0
1980
1990
2000
2010
2020